

El arce tridente

Acer buergerianum, Acer trifidum.

Familia: Aceraceae.

Origen: Regiones frías del hemisferio norte. El arce tridente en particular es del oeste de China.

Las dos especies, acer buergerianum y acer trifidum se parecen mucho, las hojas con las tres extensiones son de un verde claro en primavera y en verano para después volverse naranja en otoño. El tronco crece verticalmente hasta una altura de 12 metros y presenta una corteza preciosa en tonos grises claros.

Luz: Esta especie de arces son capaces de resistir la exposición solar, pero si no es necesario, deben ser colocados en la semisombra cuando los veranos son muy calurosos.

Poda y limpieza: Pinzado: Pinzar los nudos dejando solamente dos. **Deshojado:** Podar las hojas que desentonan por tamaño durante primavera y verano. No se suele deshojar esta especie de arce como se hace pe. con el arce palmado. Se reducen las ramas a un tercio de su longitud original para mantener la forma del árbol. En febrero se debe realizar una poda estructural para quitar las ramas que molestan en la forma principal del árbol.

Temperatura y exposición: Los arces deben ser protegidos del frío extremo aunque tampoco son demasiado sensibles. Como contrapartida soportan muy bien temperaturas altas con exposición directa al sol, como ya he mencionado anteriormente.

Replantado/Tierra: Replantar cada dos a tres años eliminando desde la mitad hasta dos tercios de las raíces finas y cambiar a una maceta más grande. Es importante eliminar siempre las raíces que se pudieran haber secado. Como macetas prefiero las cerámicas en color tierra o arcilla en formas circulares o semicirculares. La mezcla de la tierra debe componerse de 3/6 partes de tierra orgánica, 1/6 parte de humus y 2/6 partes de arena. Se deben evitar en cualquier caso tierras demasiado ácidas.

Alambrado: La mejor época para alabar está comprendida entre junio y agosto. Solamente deben ser alambradas con cuidado las ramas más gruesas, el resto del modelado se realiza mediante poda.

Aguado: Regar abundantemente en primavera y verano y reducir la cantidad de agua en invierno. Se debe asegurar una vaporización constante de las hojas.

Abonado: En marzo se empieza a aplicar fertilizante orgánico, reduciendo después la dosis durante el caluroso verano y dejando de administrar del todo a partir de finales de noviembre.

Enfermedades: Los arces pueden ser afectados por una multitud de enfermedades y parásitos; muchos de ellos pueden ser evitados manteniendo la humedad ambiental alta. En mis árboles he tenido pulgones y ácaros rojos que eliminé sumergiendo el árbol entero bajo el agua durante dos días.